



Мышиная лихорадка

Факт!

На территории Оренбургской области природные очаги этого заболевания зарегистрированы в 9 городах и 27 районах. Наиболее активными очагами являются территории Илекского, Ташлинского, Новосергиевского, Бугурусланского, Северного, Бузулукского, Кувадыкского, Тольянского районов.

Чем опасна болезнь!

Инфекция у человека протекает как лихорадочное заболевание, в котором ведущим является своеобразное поражение кровеносных сосудов и почек, выраженное в различной степени, с возможным смертельным исходом.

От человека к человеку заболевание не передается, поэтому больной человек для окружающих не опасен.

Как распознать ГЛПС?

- Инкубационный период: 7-10 дней, максимум - 40 дней.
- Первые признаки заболевания схожи с симптомами простуды: головная, мышечные боли, повышение температуры, заложенность носа, сухой кашель, иногда - тошнота, рвота, ухудшение зрения.
- После 45 дней с наступления первых симптомов: боли в пояснице, животе, сыпь, икота, нарушение работы почек, внутренние кровотечения.
- Если вы заметили симптомы заболевания и они не проходят более двух недель, надо обратиться к врачу и сдать анализы.



Что это?

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) или народное название «мышьяная лихорадка» - тяжелое, смертельно опасное инфекционное заболевание с поражением мелких кровеносных сосудов, почек, легких и других органов.

От кого можно заразиться?

Источником заражения людей вирусом ГЛПС являются мышевидные грызуны - хронические носители вируса. Во внешнюю среду вирус попадает со слюной, мочой, кровью, испражнениями грызунов. Основными хозяевами вируса в природе на территории области являются: рыжая и обыкновенная полевки, лесная, полевая, желтогорлая, домовая мышь.



Как защититься?

- проводить постоянную борьбу с грызунами в населенных пунктах, в частных подворьях, в местах возможного скопления грызунов всеми известными методами (мышеловками, капканами);
- продукты питания ни в коем случае не оставлять на земле и в других местах, доступных для грызунов, хранить только в грызунонепроницаемой упаковке или в подвешенном состоянии;
- продукты питания испорченные грызунами или со следами их жизнедеятельности не употреблять в пищу;
- при проведении работ, связанных с пылеобразованием (кормление скота сеном) обязательно пользоваться средствами защиты органов дыхания (респираторами, ватно-марлевыми повязками);
- при проведении работ в местах скопления грызунов пользоваться рукавицами, перчатками;
- во время работ не курить, не принимать пищу;
- после проведения работ в местах скопления грызунов, перед приемом пищи тщательно мыть руки с мылом.

